



Alimentation

1. Le flushing est une technique qui consiste à :

-  Apporter un supplément de minéraux ☐
-  Limiter les apports azotés ☐
-  Elever les apports énergétiques ☐

2. La durée de séjour des éponges dans le vagin sur les brebis non cyclées est de :

-  12 jours ☐
-  14 jours ☐
-  17 jours ☐

3. Le pâturage cellulaire se caractérise par :

-  des parcelles ou cellules peu nombreuses (2 à 5) pour le lot ☐
-  un chargement instantané de l'ordre de 300 à 500 brebis / ha ☐
-  des temps de séjour par parcelle compris entre 6 et 8 jours ☐

4. Il faut prévoir en stocks fourragers sur une durée d'hivernage de 90 jours pour une brebis de 65 kg :

-  30 à 50 kg de MS ☐
-  120 à 200 kg de MS ☐
-  460 à 500 kg de MS ☐

5. L'anoestrus saisonnier correspond chez la femelle à :

-  une interruption temporaire des cycles sexuels ☐
-  une irrégularité de la durée des cycles sexuels ☐
-  une extériorisation très visible des chaleurs ☐

6. Le testage des reproducteurs consiste à :

-  Evaluer les performances des descendants ☐
-  Evaluer les performances des ascendants ☐
-  Mesurer la production de sperme ☐

7. La base de sélection ovine (ensemble des animaux de race pure) représente en France en part du cheptel global :

-  5 % ☐
-  15 % ☐
-  25 % ☐

8. La surface nécessaire en bâtiment pour une brebis allaitant 2 agneaux est de :

-  0,5 à 0,8 m² ☐
-  1,5 à 2 m² ☐
-  2,5 à 3 m² ☐

9. J'ai observé 3 avortements en moins d'une semaine; je dois :

-  prévenir les services de la DDPP ☐
-  attendre un minimum de 5 avortements avant d'intervenir ☐
-  faire obligatoirement une déclaration à mon vétérinaire sanitaire ☐



10. La dystrophie musculaire communément appelé « le raide » chez les ovins est une maladie provoquée par :

-  **une carence en sélénium et en vitamine E** ☐
-  la présence d'un parasite externe ☐
-  la surconsommation de concentrés ☐

Question Communes-Europe

11. Le cheptel reproducteur ovin de l'Union Européenne (28) représente en 2016 :

-  43.7 millions de têtes ☐
-  59.1 millions de têtes ☐
-  **62.6 millions de têtes** ☐

12. Dans la composition de la carcasse, en races bouchères, les seuls gigots représentent une part de:

-  20 à 22 % ☐
-  **24 à 26 %** ☐
-  28 à 30 % ☐


13. Le cheptel total mondial en 2016 correspond à :

-  0,6 milliards de têtes ☐
-  0,8 milliards de têtes ☐
-  **1,2 milliards de têtes** ☐

14. Remettez son nom à chaque parasite :



Ascarides



Ténia



Douve

Question subsidiaire :

Citer le nom du ministre de l'agriculture actuel : Didier Guillaume

puis le nom du président de la commission de l'agriculture à l'UE : Czeslaw Adam Siekierski (député Ppe polonais),